

PHẦN VI

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

Quyết định: 2064/ QĐ-SHTT, ngày 29/08/2013

Số đơn: 6-2008-00002 (220) Ngày nộp đơn: 02/07/2008

Chủ đơn: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN RAU QUẢ XUẤT KHẨU HOÀNG GIA

Địa chỉ: Ấp Đông Hoà 2, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Cấp Giấy chứng nhận đăng chỉ dẫn địa lý số : 00036

Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý : ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ : Số 88 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Chỉ dẫn địa lý : BÌNH MINH

Sản phẩm : **Bưởi Năm Roi**

Khu vực địa lý : Xã Mỹ Hoà, xã Mỹ Thuận, xã Đông Bình, xã Đông Thành, xã Đông Thạch, xã Thuận An và thị trấn Cái Vồn thuộc huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Theo bản đồ khu vực địa lý nêu tại điều 2).

Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm

** Hình thái:*

- Hình dáng: Hình quả lê, núm thấp
- Trọng lượng quả trung bình: 1 - 1,4 kg/quả
- Vỏ quả: Màu xanh vàng đến vàng, vỏ mỏng (<15mm), dễ bóc
- Thịt quả: Màu xanh vàng
- Múi: Đều, dễ tách múi
- Con tép: Màu vàng, đều, mịn, mọng nước nhưng ráo
- Ruột: Đặc
- Tỷ lệ ăn được: 55-60%
- Mùi: Thơm đậm đà, đặc trưng
- Vị: Ngọt thanh, hơi chua nhẹ, không đắng, không the
- Hạt: Đặc biệt ít hạt hoặc không có hạt.

** Chất lượng:*

- Hàm lượng nước (%): 88,13 – 90,41
- Hàm lượng chất khô (%): 9,59 – 11,87
- Đường tổng số (%): 5,80 – 7,91
- Hàm lượng chất rắn hòa tan (độ Brix): 9,67 – 10,82

- Axid tổng số (%): 0,32 – 0,63
- Vitamin C (mg/100g): 49,16 – 67,86
- Chất xơ (%): 0,23 – 0,40

Tính chất đặc thù về điều kiện địa lý

* *Khí hậu*: Khu vực địa lý có nhiệt độ trung bình năm là 26,8°C, lượng mưa từ 1000-2000mm/năm, độ ẩm trung bình trên 80%.

* *Đất trồng*: Bưởi Năm Roi được trồng trên 3 loại đất là: đất phù sa không được bồi, đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng và đất nhân tác.

Quy trình sản xuất

* *Thành lập vườn*: Chọn nơi có nguồn nước để tưới vào mùa khô; xây bờ bao bảo vệ cây trong mùa lũ; đào mương lên líp để xả phèn, mặn và nâng cao canh tác, mương rộng 1-2m, líp rộng 6-7m và cao khoảng 40-60cm; trồng cây chắn gió, cây che mát thích hợp; chỉ trồng bưởi Năm Roi, không trồng xen với các giống cây có mùi khác.

* *Chọn cây giống*: Chọn đúng cây thuộc giống bưởi Năm Roi có các đặc điểm: tán cây tròn đều, quả phân bố đều, sạch bệnh, sinh trưởng tốt, năng suất cao và ổn định khoảng 200-300 quả/năm, chất lượng quả tốt, độ tuổi tốt nhất của cây giống là 10-25 năm và thời gian theo dõi ít nhất 3 năm liên tiếp để đảm bảo tính ổn định của các ưu điểm trên.

* *Thời điểm trồng*: Trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 4-6 dương lịch.

* *Chuẩn bị hố trồng*: Hố có kích thước 60cm x 60cm, sâu 70cm, cho phân vào hố, mỗi hố cần khoảng 20kg phân chuồng, 1kg phân lân và 0,5kg vôi bột trộn đều với nhau.

* *Trồng cây*: Cây giống đã chuẩn bị sẵn có chiều cao cây giống từ 60-70cm, đặt cây giống vào giữa hố, tháo bầu nilon, lấp đất và tưới nước, khi đặt cây phải để mắt ghép trên mặt đất, xoay thuận chiều gió, trồng xong cắm cọc giữ chặt cây con.

* *Tủ gốc giữ ẩm*: Trong mùa hè, cần tủ gốc bằng rơm, rạ khô để giữ ẩm cho cây, rơm rạ khô được rải cách gốc khoảng 20cm, khi cây chưa có quả nên trồng xen các loại cây hoa màu như bắp, đậu, khoai.

* *Tưới và tiêu nước*: Thường xuyên tưới nước cho cây vào mùa khô; mùa mưa phải tiêu nước vào những tháng mưa nhiều.

* *Vét bùn*: Bùn được vét từ mương để bồi lên líp, kết hợp việc vét bùn với việc xiết nước tạo khô hạn để cây ra hoa đồng loạt, thời gian thích hợp là tháng 2-3 dương lịch, 2 năm vét một lần, lớp bùn được vét dày khoảng 2-3cm.

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 307 TẬP B (10.2013)

* *Xử lý ra hoa cho cây bưởi*: Chủ động tạo khô hạn để kích thích cây nở hoa đồng loạt theo ý muốn, tạo khô hạn vào tháng 12-01 Dương lịch để thu hoạch quả vào dịp tết Trung Thu, tạo khô hạn vào tháng 3-4 Dương lịch để thu hoạch quả vào dịp tết Nguyên Đán; Sau khi cây được bón phân lần 2 ngưng tưới nước 15-20 ngày, sau đó tưới liên tục 3 ngày mỗi ngày 2-3 lần; tiếp theo là tưới mỗi ngày 1 lần trong 7-15 ngày; Sau khi tưới đợt đầu tiên cây sẽ ra hoa, thời gian này tưới 2 ngày 1 lần.

* *Tỉa cành*: Hàng năm, sau khi thu hoạch cần phải loại bỏ những cành đã mang quả, cành bị sâu bệnh, cành ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang quả; trong thời gian cây mang quả cần loại bỏ những cành vượt.

* *Bón phân*: Các loại phân: hữu cơ, đạm, lân, kali, phân bón lá; Ngoài việc bón lót như đã nói ở khâu chuẩn bị hố trồng, việc bón phân được thực hiện theo 5 thời điểm như sau:

- Sau khi thu hoạch, mỗi gốc: 2/3 lân + ¼ đạm + 5-20kg phân hữu cơ
- Trước khi trổ hoa, mỗi gốc: 1/3 lân + ¼ đạm
- Sau khi đậu quả, mỗi gốc: ¼ đạm + ½ kali
- Giai đoạn trái phát triển, mỗi gốc: ¼ đạm + phân bón lá
- Trước thu hoạch từ 1-2 tháng, mỗi gốc: ½ kali

Liều lượng:

Đơn vị tính : g/cây/năm

Tuổi cây	Đạm	Lân	Kali
1-2	200-400	500-700	100
4-6	500-800	800-1500	200-250
7-9	900-1200	1500-2000	300-400

* *Phòng ngừa sâu bệnh*: Quét vôi gốc hàng năm; xử lý thuốc trừ nấm bệnh, phun thuốc phòng ngừa sâu bệnh.

* *Thu hoạch và bảo quản*: Thu hoạch trong khoảng từ 7,5-8 tháng kể từ khi đậu quả đối với vụ bưởi thu hoạch vào dịp tết Nguyên Đán và trong khoảng từ 6,5-7,5 tháng kể từ khi đậu quả đối với vụ bưởi thu hoạch vào dịp tết Trung Thu; ở điều kiện bình thường, bưởi giữ nguyên chất lượng trong khoảng 40 ngày; nếu được bảo quản ở điều kiện nhiệt độ 10 °C, RH=80% và có sử dụng màng bao PE, PP thì có thể giữ chất lượng trong khoảng 3,5 tháng.
